

New Orleans criteria	Canadian CT Head Rule
1. > 60 ans	1. 65 ans ou plus
2. Vomissements	2. Vomissements (>1 épisode)
3. Amnésie antérograde persistante	3. Amnésie de plus de 30 minutes
4. Traumatisme sus-claviculaire visible	4. Suspicion de fracture crânienne ouverte, d'enfoncement ou de fracture de la base du crâne
5. Intoxication (alcool, drogue)	5. Cinétique de choc dangereuse (piéton heurté par un véhicule, passager éjecté d'un véhicule, chute de >1 m ou de 5 marches)
6. Convulsions	6. GCS 15 après 2 heures
7. Céphalées	

(adapted from Easter JS et al. JAMA. 2015 Dec 22-29;314(24):2672-81)

Les patients qui ne présentent aucun élément de l'algorithme sont à faible risque (0,3 à 0,6%) de lésion cérébrale sévère.

Chez un patient qui présente un ou plusieurs éléments de l'algorithme, le choix de le laisser sortir, de le mettre en observation ou de pratiquer un CT-scan dépend du lieu de soins, du jugement du clinicien, des préférences du patient, du nombre d'éléments de l'algorithme présents et de la présence de certains éléments supplémentaires, particulièrement graves.